


Implantaten als houvast voor een kunstgebit



Dit schrijven geeft informatie over het plaatsen van implantaten als houvast voor een kunstgebit. Hierbij spelen verschillende behandelaars een rol: de tandarts, die de implantaten plaatst; een prothetist, die de nieuwe overkappingsprothese maakt, en een mondhygiëniste.

Waarom implantaten?

Naarmate iemand langer zonder tanden en kiezen is, zijn de kaken verder geslonken. En dat geldt met name voor de onderkaak. Hierdoor zit de onderprothese vaak los. Om een nieuwe prothese meer houvast te geven kunnen implantaten worden geplaatst. Hierdoor wordt ook het verder slinken van de kaak tegengegaan.

Een implantaat is een kunstwortel, gemaakt van een speciaal metaal. Deze kunstwortel wordt in het kaakbot aangebracht en zal daarin vastgroeien. Hierop kan een gebitsprothese houvast vinden. Ook kan de tandarts (prothetist), als dat nodig is, hierop een staaf maken waarop de gebitsprothese kan worden vastgeklikt. □

Het aanbrengen van implantaten

De behandeling wordt onder steriele omstandigheden uitgevoerd, het operatieteam draagt steriele handschoenen en de boren worden met een steriele vloeistof gekoeld. Het is daarom noodzakelijk dat u de dag van de ingreep en de dagen daarop volgend goed spoelt met de voorgeschreven middelen.

Na het geven van een plaatselijke verdoving wordt er op de plaats waar de implantaten komen een snede gemaakt in het tandvlees. Hierna wordt het tandvlees opzij geschoven en wordt er in het kaakbot één gaatje per implantaat geboord. U voelt hierbij het trillen van de boor, maar het doet geen pijn. Vervolgens wordt het implantaat in dit boorgat geplaatst en wordt het tandvlees gehecht. De duur van deze ingreep is afhankelijk van het aantal implantaten. Bij twee implantaten is dat ongeveer 1 uur. De implantaten moeten onbelast in hun nieuwe stand kunnen vastgroeien. Daarom mag de eerste drie weken na de operatie niet gekauwd worden. Het eten moet daarom zacht tot vloeibaar zijn.

In principe kan alles worden gegeten, alleen niet op de gewone manier. Het voedsel kan worden fijn gemalen met behulp van een keukenmachine, blender, staafmixer of zeef. Als het fijn gemalen voedsel nog te dik is, kan dit dunner worden gemaakt door kookvocht, melk, bouillon of jus toe te voegen.

Na de behandeling is het normaal dat u enige dagen pijn krijgt. U kunt hiertegen de voorgeschreven pijnstillers gebruiken. Een dikke wang, een blauwgele verkleuring en een verminderde mondopening zijn na een wat uitgebreidere ingreep normaal. De zwelling neemt na 3 tot 5 dagen weer af. Ook kan gedurende de eerste dagen wat koorts voorkomen.

In de onderkaak loopt de onderkaakzenuw die onder meer voor het gevoel in de onderlip en kin zorgt. Door de behandeling kan deze zenuw beschadigd worden, waardoor een verminderd gevoel in de onderlip kan ontstaan. Bijna altijd herstelt zich dat spontaan binnen een aantal weken. Een enkele keer kan dat enige maanden tot een jaar duren. Hetzelfde geldt voor de zenuw die het gevoel in één helft van de tong verzorgt en die aan de tongzijde vlak naast de onderkaak loopt.

Het roken dient gedurende één week vóór de operatie tot acht weken na de operatie te worden gestopt of tenminste tot een minimum te worden beperkt. Roken geeft een wetenschappelijk bewezen verhoogd risico op complicaties, zoals een gestoorde wondgenezing van het tandvlees en mogelijk verlies van een of meerdere implantaten. □

De ingroei van implantaten

Om de aangebrachte implantaten te laten vastgroeien in het kaakbot moeten ze ongeveer drie maanden met rust worden gelaten. Dat betekent dat de oude prothese de eerste drie weken na de operatie zo min mogelijk moet worden gedragen. Daarna wordt, als dit mogelijk is, de oude prothese aangepast zodat deze gedragen kan worden totdat de nieuwe prothese klaar is. Met de aangepaste prothese mag niet worden gekauwd omdat dit een ongunstige belasting van de implantaten kan geven.

Er bestaat een gering risico (ongeveer één op de twintig) dat een implantaat niet goed vastgroeit en daarom later

weer moet worden verwijderd. Dan ontstaat weer de situatie zoals die was vóór het aanbrengen van het implantaat en moet opnieuw worden beoordeeld of er een nieuw implantaat kan worden geplaatst of dat een andere behandelmethode beter is.

De nieuwe prothese

Ongeveer 3 maanden na het aanbrengen van de implantaten begint de tandarts-prothetist met het maken van de nieuwe boven- en onderprothese. Tijdens de eerste twee bezoeken wordt de vorm van uw kaken en de plaats van de implantaten met afdrukken vastgelegd.

Tijdens het volgende bezoek wordt de plaats van de tanden bepaald en wordt vastgelegd hoe de tanden en kiezen op elkaar moeten passen. Samen met de tandarts(prothetist) kiest u de kleur en vorm van de tanden uit. Oude foto's kunnen hierbij behulpzaam zijn. Ook worden, als voor die behandeling gekozen is, de kapjes met de verbindingsstaaf op de kunstwortels gepast. Bij het volgende bezoek wordt de prothese, die dan nog van was is zodat er waar nodig nog iets kan worden veranderd, gepast en beoordeeld op esthetiek.


De keer daarop wordt de nieuwe prothese geplaatst en worden, als voor die behandeling gekozen is, de kapjes met de verbindingsstaaf definitief vastgeschroefd. Alles bij elkaar duurt dat ongeveer zes weken. Vervolgens worden er controle-afspraken gemaakt, waarbij eventuele irritatieplekjes en andere klachten kunnen worden verholpen. Daarna worden de implantaten, het tandvlees, het kaakbot en de prothese 2-4 keer per jaar gecontroleerd.

Mondhygiëne

Het is van groot belang dat u de implantaten, het tandvlees en de prothese goed schoonhoudt. De implantaten moet u verzorgen als uw eigen tanden en kiezen. Als ze niet zorgvuldig worden schoongemaakt, kan het tandvlees gaan ontsteken. Hierdoor wordt het kaakbot geïrriteerd en verliezen de implantaten hun houvast. Ook de binnenkant van de prothese moet goed worden schoongemaakt om irritatie van de slijmvliezen te voorkomen. De tandarts(prothetist) of mondhygiënist zal u dat verder uitleggen.

De kosten

De kosten zijn afhankelijk van uw verzekering. Indien u verzekerd bent bij een ziekenfonds, wordt een machtiging voor de chirurgische en prothetische fase aangevraagd. Indien u particulier verzekerd bent, dient u zelf te informeren of een vergoeding in de kosten mogelijk is. In alle gevallen wordt een eigen bijdrage gevraagd. Voorafgaande aan de behandeling wordt dit verder uitgerekend en besproken.



Aemstelgroep tandartsen

Tel: 020 4455005

www.aemstelgroep.nl

voor een intakegesprek kunt u ook via onze website een afspraak inplannen

kijk voor meer informatie op www.biocomp.eu